


Figura 2

Experimento: Dosis de inoculación de *Neoseiulus californicus* para el control de *Brevipalpus chilensis* en vid Cabernet Sauvignon
Localización: Viña Variedades, E.E. La Platina, La Pintana, Santiago (Temporada 2.001 - 02)
Diseño: Bloques al azar con 10 repeticiones de 1 planta.
Tratamientos 1) Testigo, sin inoculación ; 2) 100 Dep. / Planta; 3) 500 Dep. / Planta; 4) 1.000 Dep. / Planta. (Inoculación: 13 - X - 01)
Evaluación: Estados Móviles por Hoja (E.M./H.), muestras de 5 hojas basales, maduras y tamaño medio por repetición.
Estadística: ANOVA < 0,05, test de Tukey y Rango múltiple con lo datos transformados a Raíz de X + 1
Diferentes letras en cada columna indican diferencias estadísticas significativas

BREVIPALPUS POR HOJA

	Oct. 12	Oct. 26	Nov. 8	Nov. 23	Dic. 7	Dic. 21	Ene. 7	Ene. 18	Ene. 30	Feb. 13	Mar. 1	Mar. 15	Mar. 26
Sin Inocular	2.58	2.36	0.48	0.58	1.66	1.28	2.92	4.24	16.48	20.00	266.58 ^b	86.30	393.97 ^b
100 dep. / planta	2.01	2.00	1.33	0.52	2.75	1.97	5.10	3.60	13.47	16.10	62.70 ^a	48.42	88.93 ^a
500 dep. / planta	2.39	3.52	0.84	0.38	2.64	1.94	6.32	10.60	21.84	24.98	44.04 ^a	46.41	57.08 ^a
1.000 dep./planta	3.42	2.76	0.78	0.24	1.02	1.34	1.70	3.20	9.34	17.22	38.36 ^a	50.21	54.14 ^a
Andeva Valor P	0.9266	0.3525	0.1178	0.4009	0.2565	0.5088	0.0574	0.0080	0.4782	0.5283	0.0000	0.2114	0.0017




FITOSEIDOS POR HOJA

	Oct. 12	Oct. 26	Nov. 8	Nov. 23	Dic. 7	Dic. 21	Ene. 7	Ene. 18	Ene. 30	Feb. 13	Mar. 1	Mar. 15	Mar. 26
Sin Inocular	0.00	0.00	0.04 ^a	0.02 ^a	0.00	0.10	0.34	0.18	0.54	0.84 ^a	4.84	3.57	5.43
100 dep. / planta	0.00	0.78	0.38 ^b	0.12 ^{ab}	0.18	0.17	0.55	0.30	0.69	1.88 ^{ab}	3.62	4.20	4.73
500 dep. / planta	0.00	0.94	0.37 ^{bc}	0.22 ^{ab}	0.06	0.22	0.38	0.28	0.54	1.40 ^{ab}	2.78	3.43	4.28
1.000 dep./planta	0.03	1.78	0.76 ^c	0.38 ^b	0.04	0.14	0.30	0.18	0.34	1.08 ^{ab}	2.84	4.10	6.63

Andeva Valor P

0.0000 0.0024 0.0776 0.0946 0.6425 0.4848 0.5415 0.5837 0.0270 0.0893 0.7460 0.1517



Observaciones:

- 1) El Testigó sobrepasa el umbral de daño económico (150 e.m./h.) desde Febrero.
- 2) Control de Brevipalpus, sin diferencia estadística entre las dosis de inoculación, pero si con el Testigo (1 y 26 del III).
- 3) Presencia anticipada de depredadores en los sectores inoculados
- 4) Proporción de fitoseidos sobre arañas, mayor en sectores inoculados.
- 5) Posible mayor sensibilidad al azufre, de la cepa inoculada comparada con la del Testigo